Метаанализ исследований, посвященных изучению конкордантности мутационного статуса генов между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки

М.Ю. Федянин, А.А. Трякин, И.А. Покатаев, С.А. Тюляндин

ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава России;
Россия, 115478 Москва, Каширское шоссе, 23

Контакты: Михаил Юрьевич Федянин fedianinmu@mail.ru

Введение. В последние годы появился ряд исследований, демонстрирующих высокую гетерогенность опухолей, в том числе и рака толстой кишки.

Цель исследования — проведение метаанализа работ, посвященных изучению данного вопроса при раке толстой кишки.

Материалы и методы. Выполнен поиск статей в базе данных PubMed, а также тезисов, представленных на конференциях ASCO и ESMO, опубликованных до августа 2016 г. Основными критериями включения результатов исследования стали: сравнение мутационного статуса генов KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA в первичной опухоли и метастазах с числом больных, доступных для анализа, 10 и более. Метаанализ проводился с использованием программы Review Manager (RevMan), version 5.3.

Результаты. Статистически значимо выявляются случаи расхождения мутационного статуса генов KRAS (5 %; отношение рисков 0,95; 95 % доверительный интервал 0,92–0,98; $p = 0,003$), PIK3CA (7 %; отношение рисков 0,93; 95 % доверительный интервал 0,86–0,99; $p = 0,04$), но не BRAF и NRAS, между первичной опухолью и метастазами. Не отмечено существенных систематических ошибок, связанных с публикациями. Дискордантность по мутации в гене KRAS была значимо выше при сравнении первичной опухоли и метастазов в лимфатические узлы и составила 13,2 % ($p = 0,036$).

Выводы. Доказана возможность дискордантности мутационного статуса гена KRAS между первичной опухолью и метастазами. Учитывая небольшой процент случаев расхождения, необходимо выделить группу пациентов с высоким риском дискордантности, которым необходимо повторно определять мутационный статус генов в метастазах.

Ключевые слова: рак толстой кишки, конкордантность, мутация генов, KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, метаанализ

DOI: 10.17650/2220-3478-2017-7-1-27-41

Meta-analysis of clinical trials on concordance of mutational status of primary tumour and distant metastases of colorectal cancer

M.Yu. Fedyanin, A.A. Tryakin, I.A. Pokataev, S.A. Tyulyandin

N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Ministry of Health of Russia;
23 Kashirskoe Shosse, Moscow 115478, Russia

Background. During the last years several trials emerged demonstrating high tumour heterogeneity, including those on colorectal cancer.

Objective. These findings made us initiate a meta-analysis of trials dedicated to this question.

Materials and methods. We searched PubMed database, ASCO and ESMO abstracts for publications presented until August 2016. Studies which compared concordance of KRAS, NRAS, BRAF and PIK3CA mutations between primary tumour and metastases of colorectal cancer and which included more than 10 patients were included in meta-analysis. Meta-analysis was performed using Review Manager (RevMan), version 5.3.

Results. Statistically significant differences were observed in KRAS (5 %; RR 0.95; 95 % CI 0.92–0.98; $p = 0.003$), PIK3CA (7 %; RR 0.93; 95 % CI 0.86–0.99; $p = 0.04$) mutational status, but not BRAF and NRAS. We observed no significant publication-associated systematic errors. KRAS discordance was significantly higher between primary tumour and lymph node metastases – 13.2 % ($p = 0.036$).

Conclusions. A possibility of KRAS discordance between primary tumour and colorectal cancer metastases was demonstrated. Considering a small number of patients with discordance it is necessary to distinguish a high-risk discordance group, which will require an additional mutational analysis of metastatic nodes tissue.

Key words: colon cancer, concordance, gene mutations, KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, meta-analysis

Введение

Считалось, что если клетки метастазов происходят из клеток первичной опухоли, то они должны нести те же специфические генетические изменения. В подтверждение данной теории выступают исследования

по кариотипическому сравнению, сравнительной геномной гибридизации, флуоресцентной гибридизации *in situ*, изучению маркеров микросателлитной нестабильности и потери гетерозиготности ряда генов, проведенные в конце 1990-х годов и не показавшие различий

между клетками первичной опухоли толстой кишки и ее метастазами [1–4].

В последние годы появился ряд работ, демонстрирующих высокую гетерогенность опухолей, в том числе и рака толстой кишки [5–8]. Лекарственное лечение приводит к выживанию и последующему развитию резистентного клеточного клона, что и определяет явления субклональной эволюции на клеточном уровне [9, 10].

Принимая во внимание тот факт, что результаты исследований по изучению конкордантности между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки по мутационному статусу различных генов противоречивы, нами решено провести метаанализ исследований, посвященных изучению данного вопроса.

Материалы и методы

Нами выполнен поиск статей в базе данных PubMed по различным комбинациям слов: “colon cancer”, “colorectal cancer”, “rectal cancer”, “CRC”, “mCRC”, “colon neoplasms” [MeSH terms], “rectal neoplasms” [MeSH terms], “colorectal neoplasms” [MeSH terms], “metastases”, “metastas”, “kras”, “k-ras”, “ki-ras”, “c-K-ras” [MeSH terms], “braf”, “nras”, “PIK3CA”, “mutations” и “concordance”. Проведен поиск всех статей, опубликованных до августа 2016 г. Компьютерный поиск был дополнен изучением списка литературы обзорных статей и оригинальных работ, а также тезисов, представленных на конференциях ASCO и ESMO.

Критерии включения результатов исследования:

- в работах должно быть проведено сравнение мутационного статуса генов *KRAS*, *NRAS*, *BRAF*, *PIK3CA* в первичной опухоли и метастазах;
- количество больных, доступных для анализа, — 10 и более;
- характер биопсии метастатического очага, а также метод исследования мутаций значения не имели.

В анализ не включались работы:

- сравнивающие только метастазы или те, в которых описываемые первичные опухоли и метастатические очаги были непарными (т. е. получены не от одного пациента);
- сравнивающие первичную опухоль и циркулирующие в крови опухолевые клетки.

Диаграммы отбора исследований для анализа конкордантности мутационных изменений представлены на рис. 1.

Статистический анализ включал в себя 2 этапа.

1. Сравнение частоты мутаций в тех или иных генах в первичных опухолях и метастазах. Для подтверждения однородности результатов выполняли χ^2 -тест. В отсутствие статистически значимой гетерогенности результатов исследований ($p > 0,1$) применяли модель Мэнтелла–Хенсцеля с фиксированным эффектом для оценки отношения шансов (odds ratio — OR) и построения 95 % доверительного интервала (ДИ). В целях

Рис. 1. Диаграмма отбора исследований для метаанализа по конкордантности мутационных изменений в гене *KRAS*

Fig. 1. Flow chart of study selection for meta-analysis on concordance of *KRAS* gene mutations

исключения систематической ошибки, связанной с публикацией, был построен воронкообразный график (со значением стандартной ошибки (logOR) по оси ординат и OR по оси абсцисс).

2. Анализ уровней конкордантности мутационных изменений в различных исследованиях. Здесь также первоначально выполняли χ^2 -тест для подтверждения однородности результатов включенных в анализ исследований. В отсутствие статистически значимой гетерогенности результатов ($p > 0,1$) модель со случайными эффектами применяли для оценки отношения уровней (rate ratio — RR) соответствия мутационных изменений в том или ином гене между первичной опухолью и метастазами и построения 95 % ДИ. В целях исключения систематической ошибки, связанной с публикацией, был построен воронкообразный график (со значением стандартной ошибки (logRR) по оси ординат и RR по оси абсцисс).

Описанный анализ выполнен для генов *KRAS*, *BRAF*, *PIK3CA* в отдельности. Метаанализ проводился

с использованием программы Review Manager (RevMan), version 5.3.

Метаанализ исследований, посвященных изучению конкордантности мутационного статуса гена *KRAS* между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки

В метаанализ работ, посвященных изучению конкордантности мутационных изменений в гене *KRAS* между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки, вошли результаты 51 исследования (см. рис. 1).

Характеристика исследований представлена в табл. 1, из которой видно, что суммарная конкордантность по гену *KRAS* составила 89,6 %. Однако она не учитывает число больных, включенных в каждое исследование. В связи с этим проведен метаанализ результатов представленных работ.

На 1-м этапе мы сравнили частоту встречаемости мутаций в гене *KRAS* в первичной опухоли и метастазах. Тест на однородность результатов исследований, включенных в метаанализ, показал отсутствие статистически значимых различий ($p = 1,0$), что позволило создать модель Мэнтела–Хенсцеля с фиксированным эффектом для оценки OR в частоте мутаций и построения 95 % ДИ (рис. 2).

Как видно из рис. 2, не получено значимых отличий в частоте мутаций в гене *KRAS* в первичной опухоли и метастазах – 38,9 % (OR 1,0; 95 % ДИ 0,9–1,2; $p = 0,98$), при этом не отмечено существенных систематических ошибок, связанных с публикациями.

Проведенный метаанализ показал, что по частоте возникновения мутаций в гене *KRAS* нет различий между первичной опухолью и метастазами. Однако он не учитывает возможность расхождения мутационного статуса, в связи с чем проведен метаанализ по сравнению конкордантности между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки по мутациям в гене *KRAS*.

Тест на однородность результатов исследований, включенных в метаанализ, показал отсутствие статистически значимых различий ($p = 1,0$), что позволило построить модель со случайными эффектами для оценки отношения уровней (RR) соответствия мутационных изменений в гене *KRAS* между первичной опухолью и метастазами и построения 95 % ДИ (рис. 3). Получено подтверждение различий в мутационном статусе гена *KRAS* при сравнении материала первичной опухоли и метастазов. И хотя численно изменения мутационного статуса невелики – 5 %, они имели статистически значимый характер (RR 0,95; 95 % ДИ 0,92–0,98; $p = 0,003$). При этом не отмечено существенных систематических ошибок, связанных с публикациями.

В метаанализ вошли исследования независимо от локализации метастазов. Однако в ряде работ встречается мнение, что мутация в гене *KRAS* чаще выявляется в регионарных лимфатических узлах по сравнению

с первичной опухолью [41]. В связи с этим нами отдельно проведен анализ работ, в которых представлено сравнение мутационного статуса гена *KRAS* в первичной опухоли и метастазах рака толстой кишки в регионарные лимфатические узлы (табл. 2).

С учетом небольшого числа больных ($n = 364$) и исследований, решено было не проводить метаанализ, а сравнить уровень дискордантности по мутационному статусу между первичной опухолью и метастазами в лимфатические узлы и другими локализациями метастазов. Дискордантность по мутации в гене *KRAS* оказалась значимо выше при сравнении первичной опухоли и метастазов рака толстой кишки в лимфатические узлы и составила 13,2 % против 9,5 % при метастазах в другие органы ($p = 0,036$).

Изучение конкордантности по мутации в гене *NRAS* проводилось реже: нами найдено лишь 8 исследований по данной тематике. В связи с этим было решено не проводить метаанализ, а лишь представить результаты исследований описательно (табл. 3). Как видно из табл. 3, в среднем конкордантность по данному гену между первичной опухолью и метастазами высока и составляет 97 %.

Метаанализ исследований, посвященных изучению конкордантности мутационного статуса гена *BRAF* между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки

В 20 исследованиях также изучалась и конкордантность мутационного статуса гена *BRAF* между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки (табл. 4).

На 1-м этапе мы сравнили частоту возникновения мутаций в гене *BRAF* в первичной опухоли и метастазах. Тест на однородность результатов исследований, включенных в метаанализ, показал отсутствие статистически значимых различий ($p = 1,0$), что позволило построить модель Мэнтела–Хенсцеля с фиксированным эффектом для оценки OR различий в частоте мутаций и 95 % ДИ (рис. 4).

Как видно из рис. 4, не получено значимых отличий в частоте мутаций в гене *BRAF* в первичной опухоли и метастазах – 4,9 и 5,7 % соответственно (OR 1,18; 95 % ДИ 0,79–1,75; $p = 0,42$). При этом не отмечено существенных систематических ошибок, связанных с публикациями.

Проведенный метаанализ показал, что по частоте мутаций в гене *BRAF* нет различий между первичной опухолью и метастазами. Однако он не учитывает возможность расхождения мутационного статуса, в связи с чем проведен 2-й метаанализ – по сравнению конкордантности между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки по мутациям в гене *BRAF*.

Тест на однородность результатов исследований, включенных в метаанализ, показал отсутствие

Таблица 1. Результаты исследований, посвященных изучению конкордантности мутаций в гене *KRAS* между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки

Table 1. Results of trials on *KRAS* gene concordance between primary tumour and colorectal cancer distant metastases

Исследование Study	Число больных Number of patients	Мутация в первичной опухоли Primary tumour mutation		Мутация в метастазе Distant metastases mutation		Конкордантность, % Concordance, %
		<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
F. Al-Mulla и соавт., 1998 [11] F. Al-Mulla et al., 1998 [11]	26	10	38,5	11	42,3	81,0
I. Albanese и соавт., 2004 [12] I. Albanese et al., 2004 [12]	30	14	46,7	13	43,3	70,0
S. Artale и соавт., 2008 [13] S. Artale et al., 2008 [13]	48	11	22,9	12	25,0	94,0
S. E. Baldus и соавт., 2010 [14] S. E. Baldus et al., 2010 [14]	20	9	45,0	8	40,0	95,0
	55	29	52,7	16	29,1	69,0
C. Bossard и соавт., 2012 [15] C. Bossard et al., 2012 [15]	18	11	61,1	11	61,1	77,8
A. R. Brannon и соавт., 2014 [16] A. R. Brannon et al., 2014 [16]	69	38	55,1	38	55,1	100
P. Cejas и соавт., 2009 [17] P. Cejas et al., 2009 [17]	110	37	33,6	40	36,4	95,0
P. Cejas и соавт., 2012 [18] P. Cejas et al., 2012 [18]	117	45	38,5	49	41,9	91,0
M. C. Etienne-Grimaldi и соавт., 2008 [19] M. C. Etienne-Grimaldi et al., 2008 [19]	48	16	33,3	16	33,3	100
S. D. Finkelstein и соавт., 1993 [20] S. D. Finkelstein et al., 1993 [20]	23	12	52,2	12	52,2	100
K. L. Garm Spindler и соавт., 2009 [21] K. L. Garm Spindler et al., 2009 [21]	31	9	29,0	7	22,6	94,0
S. Gattenlohner и соавт., 2009 [22] S. Gattenlohner et al., 2009 [22]	106	42	39,6	41	38,7	95,0
Q. He и соавт., 2016 [23] Q. He et al., 2016 [23]	59	10	16,9	11	18,6	76,3
A. Italiano и соавт., 2010 [24] A. Italiano et al., 2010 [24]	59	24	40,7	25	42,4	95,0
Y. Kaneko и соавт., 2014 [25] Y. Kaneko et al., 2014 [25]	90	31	34,4	28	31,1	90,0
H. Kawamata и соавт., 2015 [26] H. Kawamata et al., 2015 [26]	43	12	27,9	14	32,6	81,4
Y. Kawamoto и соавт., 2012 [27] Y. Kawamoto et al., 2012 [27]	24	16	66,7	16	66,7	100
M. J. Kim и соавт., 2012 [28] M. J. Kim et al., 2012 [28]	143	62	43,4	63	44,1	87,7
B. Kleist и соавт., 2014 [29] B. Kleist et al., 2014 [29]	42	25	59,5	26	61,9	83,0
	109	47	43,1	56	51,4	88,0
N. Knijn и соавт., 2011 [30] N. Knijn et al., 2011 [30]	305	108	35,4	104	34,1	96,4
S. Kopetz и соавт., 2014 [31] S. Kopetz et al., 2014 [31]	107	60	56,1	55	51,4	89,0
S. Lee и соавт., 2014 [32] S. Lee et al., 2014 [32]	15	5	33,3	4	26,7	80,0
Z. Z. Li и соавт., 2016 [33] Z. Z. Li et al., 2016 [33]	58	15	25,9	18	31,0	81,0
L. Losi и соавт., 1992 [34] L. Losi et al., 1992 [34]	16	13	81,3	13	81,3	100

Таблица 1. (Окончание)

Table 1. (End)

Исследование Study	Число больных Number of patients	Мутация в первичной опухоли Primary tumour mutation		Мутация в метастазе Distant metastases mutation		Конкордантность, % Concordance, %
		n	%	n	%	
P. Mariani и соавт., 2010 [36] P. Mariani et al., 2010 [36]	38	20	52,6	21	55,3	97,0
U. Miglio и соавт., 2013 [37] U. Miglio et al., 2013 [37]	45	17	37,8	17	37,8	100
F. Molinari и соавт., 2009 [38] F. Molinari et al., 2009 [38]	37	16	43,2	15	40,5	92,0
B. Mostert и соавт., 2013 [39] B. Mostert et al., 2013 [39]	42	9	21,4	10	23,8	78,6
A. Murata и соавт., 2013 [40] A. Murata et al., 2013 [40]	26	6	23,1	6	23,1	92,3
C. Oliveira и соавт., 2007 [41] C. Oliveira et al., 2007 [41]	28	18	64,3	23	82,1	67,8
J.J. Oudejans и соавт., 1991 [42] J.J. Oudejans et al., 1991 [42]	31	12	38,7	14	45,2	87,0
P. Paliogiannis и соавт., 2014 [43] P. Paliogiannis et al., 2014 [43]	31	9	29,0	8	25,8	90,3
J.H. Park и соавт., 2011 [44] J.H. Park et al., 2011 [44]	17	5	29,4	5	29,4	76,0
F. Perrone и соавт., 2009 [45] F. Perrone et al., 2009 [45]	10	2	20,0	2	20,0	80,0
D. Santini и соавт., 2008 [46] D. Santini et al., 2008 [46]	99	38	38,4	36	36,4	96,0
C.C. Schimanski и соавт., 1999 [47] C.C. Schimanski et al., 1999 [47]	22	21	95,5	22	100	95,0
Y.Q. Shen и соавт., 2010 [48] Y.Q. Shen et al., 2010 [48]	20	6	30,0	6	30,0	90,0
E.A. Siyar и соавт., 2015 [49] E.A. Siyar et al., 2015 [49]	31	13	41,9	13	41,9	78,0
B. Suchy и соавт., 1992 [50] B. Suchy et al., 1992 [50]	66	14	21,2	14	21,2	100
J.S. Thebo и соавт., 2000 [51] J.S. Thebo et al., 2000 [51]	20	20	100	16	80,0	80,0
J. Tie и соавт., 2011 [52] J. Tie et al., 2011 [52]	97	39	40,2	43	44,3	91,8
E. Vakiani и соавт., 2012 [53] E. Vakiani et al., 2012 [53]	84	41	48,8	42	50,0	97,6
S. Vignot и соавт., 2015 [54] S. Vignot et al., 2015 [54]	13	7	53,8	7	53,8	100
A. Voutsina и соавт., 2013 [55] A. Voutsina et al., 2013 [55]	83	32	38,6	27	32,5	94,0
T. Watanabe и соавт., 2011 [56] T. Watanabe et al., 2011 [56]	43	15	34,9	17	39,5	88,4
J.C. Weber и соавт., 2007 [57] J.C. Weber et al., 2007 [57]	36	14	38,9	14	38,9	100
H.B. Xian и соавт., 2010 [58] H.B. Xian et al., 2010 [58]	72	24	33,3	23	31,9	93,1
P. Zauber и соавт., 2003 [59] P. Zauber et al., 2003 [59]	42	22	52,4	22	52,4	100
Всего <i>Total</i>	2847	1148	38,9	1149	38,9	89,6

Рис. 2. График «форест-плот» метаанализа исследований по изучению частоты мутаций в гене *KRAS* в первичной опухоли и в метастазах рака толстой кишки

Fig. 2. Forrest plot for meta-analysis of trials on *KRAS* mutation frequencies in primary tumour and distant metastases of colorectal cancer

статистически значимых различий ($p = 1,0$), что позволило построить модель со случайными эффектами для оценки отношения уровней (RR) соответствия мутационных изменений в гене *BRAF* между первичной опухолью и метастазами и 95 % ДИ. Нами не получено

подтверждения различий в мутационном статусе гена *BRAF* при сравнении материала первичной опухоли и метастазов (RR 0,98; 95 % ДИ 0,93–1,04; $p = 0,57$). При этом не отмечено существенных систематических ошибок, связанных с публикациями.

Рис. 3. График «форест-плот» метаанализа исследований по изучению конкордантности мутаций в гене *KRAS* в первичной опухоли и в метастазах рака толстой кишки

Fig. 3. Forrest plot for meta-analysis of trials on concordance of *KRAS* mutation in primary tumour and distant metastases of colorectal cancer

Метаанализ исследований, посвященных изучению конкордантности мутационного статуса гена *PIK3CA* между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки

В 14 исследованиях также изучена конкордантность мутационного статуса гена *PIK3CA* между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки (табл. 5).

На 1-м этапе мы сравнили частоту мутаций в гене *PIK3CA* в первичной опухоли и метастазах. Тест на однородность результатов исследований, включенных в метаанализ, показал отсутствие статистически зна-

чимых различий ($p = 1,0$), что позволило построить модель Мэнтелла–Хенсцеля с фиксированным эффектом для оценки отношения шансов различий в частоте мутаций (OR) и 95 % ДИ (рис. 5). Отмечается некоторая тенденция к увеличению частоты встречаемости мутаций в гене *PIK3CA* в метастазах по сравнению с первичной опухолью — 17,8 и 15,2 % соответственно (OR 1,23; 95 % ДИ 0,95–1,60; $p = 0,12$). При этом не отмечено существенных систематических ошибок, связанных с публикациями.

Проведенный метаанализ показал, что по частоте мутаций в гене *PIK3CA* нет существенных различий

Таблица 2. Результаты исследований, посвященных изучению конкордантности мутаций в гене KRAS между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки в регионарные лимфатические узлы

Table 2. Results of trials on KRAS gene concordance between primary tumour and colorectal cancer lymph node metastases

Исследование Study	N	Мутация в первичной опухоли Primary tumour mutation		Мутация в метастазе Lymph node metastasis mutation		Конкордантность, % Concordance, %
		n	%	n	%	
F. Al-Mulla и соавт., 1998 [11] F. Al-Mulla et al., 1998 [11]	26	10	38,5	11	42,3	81,0
S. E. Baldus и соавт., 2010 [14] S. E. Baldus et al., 2010 [14]	55	29	52,7	16	29,1	69,0
S. D. Finkelstein и соавт., 1993 [20] S. D. Finkelstein et al., 1993 [20]	23	12	52,2	12	52,2	100
B. Kleist и соавт., 2014 [29] B. Kleist et al., 2014 [29]	109	47	43,1	56	51,4	88,0
F. Molinari и соавт., 2009 [38] F. Molinari et al., 2009 [38]	15	8	53,3	8	53,3	100
A. Murata и соавт., 2013 [40] A. Murata et al., 2013 [40]	26	6	23,1	6	23,1	92,3
C. Oliveira и соавт., 2007 [41] C. Oliveira et al., 2007 [41]	28	18	64,3	23	82,1	67,8
Y. Q. Shen и соавт., 2010 [48] Y. Q. Shen et al., 2010 [48]	20	6	30,0	4	20,0	90,0
J. S. Thebo и соавт., 2000 [51] J. S. Thebo et al., 2000 [51]	20	20	100	16	80,0	80,0
P. Zauber и соавт., 2003 [59] P. Zauber et al., 2003 [59]	42	22	52,4	22	52,4	100
<i>Всего</i> <i>Total</i>	364	178	38,9	174	38,9	86,8

Таблица 3. Результаты исследований, посвященных изучению конкордантности мутаций в гене NRAS между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки в лимфатические узлы

Table 3. Results of trials on NRAS gene concordance between primary tumour and colorectal cancer lymph node metastases

Исследование Study	N	Мутация в первичной опухоли Primary tumour mutation		Мутация в метастазе Lymph node metastasis mutation		Конкордантность, % Concordance, %
		n	%	n	%	
A. R. Brannon и соавт., 2014 [16] A. R. Brannon et al., 2014 [16]	69	2	3	2	3	100
Y. Kawamoto и соавт., 2012 [27] Y. Kawamoto et al., 2012 [27]	24	1	4	1	4	100
B. Kleist и соавт., 2014 [29] B. Kleist et al., 2014 [29]	42	1	2	1	2	100
	109	5	5	6	6	99
S. Kopetz и соавт., 2014 [31] S. Kopetz et al., 2014 [31]	107	5	5	5	5	83
Z. Z. Li и соавт., 2016 [33] Z. Z. Li et al., 2016 [33]	10	1	10	0	0	90
J. Tie и соавт., 2011 [52] J. Tie et al., 2011 [52]	97	8	8	9	9	99
E. Vakiani и соавт., 2012 [53] E. Vakiani et al., 2012 [53]	84	1	1	1	1	100
J. S. Vermaat и соавт., 2012 [60] J. S. Vermaat et al., 2012 [60]	21	1	5	1	5	100
<i>Всего</i> <i>Total</i>	563	25	4	26	5	97

Таблица 4. Результаты исследований, посвященных изучению конкордантности мутаций в гене *BRAF* между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки

Table 4. Results of trials on *BRAF* gene concordance between primary tumour and colorectal cancer distant metastases

Исследование Study	N	Мутация в первичной опухоли Primary tumour mutation		Мутация в метастазе Lymph node metastasis mutation		Конкордантность, % Concordance, %
		n	%	n	%	
S. Artale и соавт., 2008 [13] S. Artale et al., 2008 [13]	48	1	2,1	2	4,2	98,0
S.E. Baldus и соавт., 2010 [14] S.E. Baldus et al., 2010 [14]	20	1	5,0	1	5,0	100
	55	1	1,8	2	3,6	98,0
A.R. Brannon и соавт., 2014 [16] A.R. Brannon et al., 2014 [16]	69	3	4,3	3	4,3	100
P. Cejas и соавт., 2012 [18] P. Cejas et al., 2012 [18]	70	1	1,4	1	1,4	100
A. Italiano и соавт., 2010 [24] A. Italiano et al., 2010 [24]	48	1	2,1	2	4,2	98,0
Y. Kawamoto и соавт., 2012 [27] Y. Kawamoto et al., 2012 [27]	24	0	0	0	0,0	100
B. Kleist и соавт., 2014 [29] B. Kleist et al., 2014 [29]	42	1	2,4	0	0,0	98,0
	109	15	13,8	14	12,8	99,0
S. Kopetz и соавт., 2014 [31] S. Kopetz et al., 2014 [31]	107	5	4,7	6	5,6	83,0
Z.Z. Li и соавт., 2016 [33] Z.Z. Li et al., 2016 [33]	10	0	0	2	20,0	80,0
F. Molinari и соавт., 2009 [38] F. Molinari et al., 2009 [38]	36	2	5,6	2	5,6	100
A. Murata и соавт., 2013 [40] A. Murata et al., 2013 [40]	26	0	0	0	0,0	100
C. Oliveira и соавт., 2007 [41] C. Oliveira et al., 2007 [41]	28	7	25,0	10	35,7	89,3
J.H. Park и соавт., 2011 [44] J.H. Park et al., 2011 [44]	17	2	11,8	3	17,6	90,0
C. Schafroth и соавт., 2015 [61] C. Schafroth et al., 2015 [61]	13	4	30,8	4	30,8	100
J. Tie и соавт., 2011 [52] J. Tie et al., 2011 [52]	97	2	2,1	2	2,1	100
D. Tougeron и соавт., 2013 [62] D. Tougeron et al., 2013 [62]	23	0	0	0	0,0	100
E. Vakiani и соавт., 2012 [53] E. Vakiani et al., 2012 [53]	84	4	4,8	4	4,8	100
J.S. Vermaat и соавт., 2012 [60] J.S. Vermaat et al., 2012 [60]	21	0	0	0	0,0	100
A. Voutsina и соавт., 2013 [55] A. Voutsina et al., 2013 [55]	83	1	1,2	1	1,2	100
<i>Всего</i> <i>Total</i>	<i>1030</i>	<i>51</i>	<i>4,9</i>	<i>59</i>	<i>5,7</i>	<i>96,8</i>

между первичной опухолью и метастазами. Однако он не учитывает возможность расхождения мутационного статуса, в связи с чем проведен 2-й метаанализ — по сравнению конкордантности между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки по мутациям в гене *PIK3CA*.

Тест на однородность результатов исследований, включенных в метаанализ, показал наличие статистически значимых различий ($p = 0,002$; $I^2 = 60\%$). Это обусловлено результатами работ S. Kopetz и соавт. [32] и Q. He и соавт. [24] с существенным расхождением в мутационном статусе гена *PIK3CA* между первичной

Рис. 4. График «форест-плот» метаанализа исследований по изучению частоты мутаций в гене *BRAF* в первичной опухоли и в метастазах рака толстой кишки

Fig. 4. Forrest plot for meta-analysis of trials on *BRAF* mutation frequencies in primary tumour and distant metastases of colorectal cancer

опухолью и метастазами в сравнении с другими исследованиями. В исследовании Q. Не и соавт. отмечена и дискордантность по мутации в гене *KRAS* – 23,7 %, что также выбивается из общей массы исследований, поэтому результаты данной работы решено исключить из анализа. После этого мы статистически подтвердили однородность данных, включенных в метаанализ ($p = 0,22$; $I^2 = 22$ %), что позволило построить модель со случайными эффектами для оценки отношения уровней (RR) соответствия мутационных изменений в гене *PIK3CA* между первичной опухолью и метастазами и 95 % ДИ. Нами было получено подтверждение различий в мутационном статусе гена *PIK3CA* при сравнении материала первичной опухоли и метастазов (RR 0,93; 95 % ДИ 0,86–0,99; $p = 0,04$). При этом не отмечено существенных систематических ошибок, связанных с публикациями.

Обсуждение

Наиболее крупная работа, посвященная оценке конкордантности статуса гена *KRAS* при раке толстой кишки между первичной опухолью и метастазами в печень, была опубликована в 2011 г. В исследование было включено 305 пар образцов опухоли. Выявлен высокий процент конкордантности по мутационному статусу гена *KRAS* – 96,4 % [30]. Авторы объясняют такое высокое соответствие мутационного статуса между первичной опухолью и метастазами в печень большим числом больных, включенных в анализ ($n = 305$), од-

нородностью локализации метастатических очагов (только печень) и исследованием только 1 гена – *KRAS*. Тогда как в других работах недостаточно «мощности» для исключения ложнонегативных результатов. Кроме этого, метастазы локализовались в различных органах. Так же как и в других работах, при локализации метастазов в лимфатических узлах, частота случаев расхождения в статусе гена *KRAS* был выше (20 %). Случаи расхождения в статусе гена авторы объясняют тем, что процесс метастазирования шел раньше приобретения тех или иных мутаций в клетках первичной опухоли. Другим объяснением может служить гетерогенность опухоли по статусу гена *KRAS*. Также можно спекулировать на тему невыявленных вторых первичных опухолей в толстой кишке как источника метастазов с другим мутационным статусом гена.

Следует учитывать и метод детекции мутаций в гене *KRAS*. Так, например, при сравнении 3 методов – cobas *KRAS* Mutation Test kit, Therascreen® *KRAS* PCR kit, Sanger sequencing – только 1-й показывал высокую чувствительность к выявлению мутантных аллелей гена *KRAS* [63]. Применение наиболее чувствительных методов чаще приводит к выявлению полного соответствия по мутационному статусу первичной опухоли метастазам рака толстой кишки [19]. Однако встает вопрос о клинической релевантности низкого уровня мутантных аллелей в отношении назначения анти-EGFR моноклональных антител. Например, в работе D. Tougeron и соавт. частота объективного эффекта

Таблица 5. Результаты исследований, посвященных изучению конкордантности мутаций в гене *PIK3CA* между первичной опухолью и метастазами рака толстой кишки

Table 5. Results of trials on *PIK3CA* gene concordance between primary tumour and colorectal cancer distant metastases

Исследование Study	N	Мутация в первичной опухоли Primary tumour mutation		Мутация в метастазе Lymph node metastasis mutation		Конкордантность, % Concordance, %
		n	%	n	%	
S.E. Baldus и соавт., 2010 [14] S.E. Baldus et al., 2010 [14]	20	3	15,0	4	20,0	95,0
	55	8	14,5	15	27,3	69,0
A.R. Brannon и соавт., 2014 [16] A.R. Brannon et al., 2014 [16]	69	14	20,3	13	18,8	100
P. Cejas и соавт., 2012 [18] P. Cejas et al., 2012 [18]	70	5	7,1	7	10,0	91,0
Q. He и соавт., 2016 [23] Q. He et al., 2016 [23]	59	26	44,1	32	54,2	76,3
Y. Kawamoto и соавт., 2012 [27] Y. Kawamoto et al., 2012 [27]	24	2	8,3	2	8,3	100
B. Kleist и соавт., 2014 [29] B. Kleist et al., 2014 [29]	42	0	0,0	0	0,0	83,0
	109	8	7,3	12	11,0	88,0
S. Kopetz и соавт., 2014 [31] S. Kopetz et al., 2014 [31]	107	22	20,6	22	20,6	89,0
Z.Z. Li и соавт., 2016 [33] Z.Z. Li et al., 2016 [33]	10	2	20,0	2	20,0	81,0
A. Murata и соавт., 2013 [40] A. Murata et al., 2013 [40]	26	7	26,9	7	26,9	92,3
J. Tie и соавт., 2011 [52] J. Tie et al., 2011 [52]	97	10	10,3	14	14,4	91,8
E. Vakiani и соавт., 2012 [53] E. Vakiani et al., 2012 [53]	84	15	17,9	15	17,9	97,6
J.S. Vermaat и соавт., 2012 [60] J.S. Vermaat et al., 2012 [60]	21	0	0,0	0	0,0	100
A. Voutsina и соавт., 2013 [55] A. Voutsina et al., 2013 [55]	83	11	13,3	11	13,3	94,0
Всего Total	876	133	15,2	156	17,8	89,9

комбинации анти-EGFR-антител с химиотерапией составила 37 % при «диком» типе гена *KRAS* против 6,7 % в случаях, когда выявлялась незначительная доля (< 10 %) мутантных аллелей данного гена [64]. Нельзя исключать банальные ложноположительные и ложно-негативные результаты тестов [65]. Все вышеперечисленное и определило необходимость изучения конкордантности мутационного статуса генов на большом числе больных в рамках метаанализа.

Проведенный нами метаанализ показал, что при сравнении частоты мутаций между первичной опухолью и метастазами по генам *KRAS*, *NRAS*, *BRAF* значимых различий получено не было. Отмечена некоторая тенденция к увеличению частоты встречаемости мутаций в гене *PIK3CA* в метастазах по сравнению с первичной

опухолью. В то же время статистически значимо, хоть и в небольшом проценте случаев, выявляются случаи расхождения мутационного статуса генов *KRAS*, *PIK3CA*, но не *BRAF* и *NRAS* между первичной опухолью и метастазами. Данные находки говорят о необходимости определения признаков, ассоциированных с дискордантностью, в целях формирования популяции больных, которым необходимо повторное диагностирование мутационного статуса такого клинически значимого гена, как *KRAS*. Кроме того, подтверждена и более выраженная степень дискордантности по мутации в гене *KRAS* при сравнении первичной опухоли и метастазов рака толстой кишки в лимфатические узлы.

К настоящему времени опубликованы 2 метаанализа, посвященные изучению мутационного статуса

Рис. 5. График «форест-плот» метаанализа исследований по изучению частоты мутаций в гене PIK3CA в первичной опухоли и в метастазах рака толстой кишки

Fig. 5. Forrest plot for meta-analysis of trials on PIK3CA mutation frequencies in primary tumour and distant metastases of colorectal cancer

генов *KRAS* в первичной опухоли и метастазах рака толстой кишки. При изучении частоты встречаемости мутаций в первичной опухоли толстой кишки и метастазах С.В. Нан и соавт. отметили совпадение данных показателей у больных в исследованиях, вошедших в метаанализ. На большем числе работ мы также подтвердили данное наблюдение. Однако просто частота мутаций не отражает возможное изменение мутационного статуса генов, так как у одного пациента мутация в метастазе может не определяться, у другого она будет выявляться только в метастазе, а у третьего обнаруженная мутация в метастазе будет отличной от первичной опухоли локализации в изучаемом гене. При этом на общем числе больных частота встречаемости мутаций в первичной опухоли и метастазах будет равной [66]. Поэтому мы провели 2-й вариант метаанализа, который был нацелен именно на изучение соответствия мутационного статуса, отчасти похожий на методику метаанализа, результаты которого были опубликованы в 2015 г. Ранее С. Мао и соавт. выполнили метаанализ 46 исследований, показавший общую конкордантность по мутации гена *KRAS* 92,0 % (73,4 % — при метастазах в лимфатические узлы), *BRAF* — 96,8 %, *PIK3CA* — 93,9 %. В качестве изучаемого критерия они использовали понятие конкордантности, при этом изучали его в виде показателей чувствительности и специфичности метода оценки мутационного статуса генов [67]. Мы же хотели показать, что случаи дискордантности не случайны и что выявляются они в определенном проценте случаев, при этом взяв критерий для оценки, понятный клиницистам.

Анализируя работы, вошедшие в метаанализ, следует также отметить ряд замечаний, определяющих недостатки нашего исследования. В анализ включали

пациентов как с синхронными, так и с метастазами. При этом даже чаще сравнивали первичную опухоль с синхронно возникающими метастазами. Зачастую из текста статьи нельзя было установить, получал ли пациент химиотерапию до взятия материала для молекулярного анализа из метастатического очага. В ряде работ описывались режимы без применения таргетных препаратов. Известно, что метастазный характер метастазов, проведение химиотерапии или терапии анти-EGFR-препаратами могут приводить к отбору клонов с мутационными изменениями в генах *RAS* [31, 68].

Таким образом, остаются открытыми вопросы в отношении конкордантности между первичной опухолью и метастазами, особенно если в промежутке пациент получал противоопухолевое лечение; мало данных по отличию различных метастазов между собой по мутационному статусу, особенно при различной их органной локализации. Последнее подтверждается высоким уровнем несоответствия по мутационному статусу гена *KRAS* между первичной опухолью и метастазами в лимфатические узлы по сравнению с другими локализациями; между первичной опухолью и циркулирующими в крови опухолевыми клетками или клеткам опухоли в костном мозге дискордантность может достигать 50 % [69, 70]. Интересно изучить, имеются ли различия в мутационном статусе первично-множественных опухолей толстой кишки, особенно возникающих синхронно, и отличаются ли они от метастазов. Видится клинически важным определение факторов, ассоциированных с дискордантностью по мутационному статусу между первичной опухолью и метастазами. Остается до конца не изученной прогностическая роль расхождения

мутационного статуса генов. Все перечисленные вопросы говорят, что исследования в этой области остаются актуальными.

Заключение

При сравнении частоты мутаций между первичной опухолью и метастазами по различным генам (*KRAS*, *NRAS*, *BRAF*) значимых различий получено не было. Отмечена некоторая тенденция к увеличению частоты встречаемости мутаций в гене *PIK3CA* в метастазах по сравнению с первичной опухолью. Статистически

значимо выявляются случаи расхождения мутационного статуса генов *KRAS*, *PIK3CA*, но не *BRAF* и *NRAS* между первичной опухолью и метастазами. Подтверждена более выраженная степень дискордантности по мутации в гене *KRAS* при сравнении первичной опухоли и метастазов рака толстой кишки в лимфатические узлы, что требует проведения дальнейших исследований по изучению факторов, ассоциированных с дискордантностью по мутационному статусу генов *RAS*. Это поможет выделить группу пациентов, которым необходимо повторно определять мутационный статус генов в метастазах.

Дата подачи: 12.10.2016.

Дата принятия к публикации: 25.10.2016.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование: исследование проводилось без каких-либо сторонних финансовых средств или грантов.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Al-Mulla F., Keith W.N., Pickford I.R. et al. Comparative genomic hybridization analysis of primary colorectal carcinomas and their synchronous metastases. *Genes Chromosomes Cancer* 1999;24(4):306–14.
- Paredes-Zaghlul A., Kang J.J., Essig Y.P. et al. Analysis of colorectal cancer by comparative genomic hybridization: evidence for induction of the metastatic phenotype by loss of tumor suppressor genes. *Clin Cancer Res* 1998;4(4):879–86.
- Korn W.M., Yasutake T., Kuo W.L. et al. Chromosome arm 20q gains and other genomic alterations in colorectal cancer metastatic to liver, as analyzed by comparative genomic hybridization and fluorescence *in situ* hybridization. *Genes Chromosomes Cancer* 1999;25(2):82–90.
- Blaker H., Graf M., Rieker R.J. et al. Comparison of losses of heterozygosity and replication errors in primary colorectal carcinomas and corresponding liver metastases. *J Pathol* 1999;188(3):258–62.
- McGranahan N., Swanton C. Biological and therapeutic impact of intratumor heterogeneity in cancer evolution. *Cancer Cell* 2015;27(1):15–26. DOI: 10.1016/j.ccell.2014.12.001.
- Gerlinger M., Rowan A.J., Horswell S. et al. Intratumor heterogeneity and branched evolution revealed by multiregion sequencing. *N Engl J Med* 2012;366(10):883–92. DOI: 10.1056/NEJMoa1113205.
- Bettegowda C., Sausen M., Leary R.J. et al. Detection of circulating tumor DNA in early- and late-stage human malignancies. *Sci Transl Med* 2014;6(224):224ra24. DOI: 10.1126/scitranslmed.3007094.
- Piotrowska Z., Niederst M.J., Karlovich C.A. et al. Heterogeneity underlies the emergence of EGFR790 wild-type clones following treatment of T790M-positive cancers with a third-generation EGFR inhibitor. *Cancer Discov* 2015;5(7):713–22. DOI: 10.1158/2159-8290.CD-15-0399.
- Diaz L.A. Jr, Williams R.T., Wu J. et al. The molecular evolution of acquired resistance to targeted EGFR blockade in colorectal cancers. *Nature* 2012;486(7404):537–40. DOI: 10.1038/nature11219.
- Misale S., Yaeger R., Hobor S. et al. Emergence of KRAS mutations and acquired resistance to anti-EGFR therapy in colorectal cancer. *Nature* 2012;486(7404):532–6. DOI: 10.1038/nature11156.
- Al-Mulla F., Going J.J., Sowden E.T. et al. Heterogeneity of mutant versus wild-type Ki-ras in primary and metastatic colorectal carcinomas, and association of codon-12 valine with early mortality. *J Pathol* 1998;185(2):130–8.
- Albanese I., Scibetta A.G., Migliavacca M. et al. Heterogeneity within and between primary colorectal carcinomas and matched metastases as revealed by analysis of Ki-ras and p53 mutations. *Biochem Biophys Res Commun* 2004;325(3):784–91.
- Artale S., Sartore-Bianchi A., Veronese S.M. et al. Mutations of KRAS and BRAF in primary and matched metastatic sites of colorectal cancer. *J Clin Oncol* 2008;26(25):4217–9. DOI: 10.1200/JCO.2008.18.7286.
- Baldus S.E., Schaefer K.L., Engers R. et al. Prevalence and heterogeneity of KRAS, BRAF, and PIK3CA mutations in primary colorectal adenocarcinomas and their corresponding metastases. *Clin Cancer Res* 2010;16(3):790–9. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-09-2446.
- Bossard C., Küry S., Jamet P. et al. Delineation of the infrequent mosaicism of KRAS mutational status in metastatic colorectal adenocarcinomas. *J Clin Pathol* 2012;65(5):466–9. DOI: 10.1136/jclinpath-2011-200608.
- Brannon A.R., Vakiani E., Sylvester B.E. et al. Comparative sequencing analysis reveals high genomic concordance between matched primary and metastatic colorectal cancer lesions. *Genome Biol* 2014;15(8):454. DOI: 10.1186/s13059-014-0454-7.
- Cejas P., Lopez-Gomez M., Aguayo C. et al. KRAS mutations in primary colorectal cancer tumors and related metastases: a potential role in prediction of lung metastasis. *PLoS One* 2009;4:e8199. DOI: 10.1371/journal.pone.0008199.
- Cejas P., López-Gómez M., Aguayo C. et al. Analysis of the concordance in the EGFR pathway status between primary tumors and related metastases of colorectal cancer patients: implications for cancer therapy. *Curr Cancer Drug Targets* 2012;12(2):124–31.
- Etienne-Grimaldi M.C., Formento J.L., Francoual M. et al. K-Ras mutations and treatment outcome in colorectal cancer patients receiving exclusive fluoropyrimidine therapy. *Clin Cancer Res* 2008;14(15):4830–5. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-07-4906.
- Finkelstein S.D., Sayegh R., Christensen S. et al. Genotypic classification of colorectal adenocarcinoma. *Cancer* 1993;71(12):3827–38.

21. Garm Spindler K.L., Pallisgaard N., Rasmussen A.A. et al. The importance of KRAS mutations and EGF61A4G polymorphism to the effect of cetuximab and irinotecan in metastatic colorectal cancer. *Ann Oncol* 2009;20(5):879–84. DOI: 10.1093/annonc/mdn712.
22. Gattenlohner S., Etschmann B., Kunzmann V. et al. Concordance of KRAS/BRAF mutation status in metastatic colorectal cancer before and after anti-EGFR therapy. *J Oncol* 2009;83:16–26. DOI: 10.1155/2009/831626.
23. He Q., Xu Q., Wu W. et al. Comparison of KRAS and PIK3CA gene status between primary tumors and paired metastases in colorectal cancer. *Onco Targets Ther* 2016;9:2329–35. DOI: 10.2147/OTT.S97668.
24. Italiano A., Hostein I., Soubeyran I. et al. KRAS and BRAF mutational status in primary colorectal tumors and related metastatic sites: biological and clinical implications. *Ann Surg Oncol* 2010;17(5):1429–34. DOI: 10.1245/s10434-009-0864-z.
25. Kaneko Y., Kuramochi H., Nakajima G. et al. Degraded DNA may induce discordance of KRAS status between primary colorectal cancer and corresponding liver metastases. *Int J Clin Oncol* 2014;19(1):113–20. DOI: 10.1007/s10147-012-0507-4.
26. Kawamata H., Yamashita K., Kojo K. et al. Discrepancies between the K-ras mutational status of primary colorectal cancers and corresponding liver metastases are found in codon 13. *Genomics* 2015;106(2):71–5. DOI: 10.1016/j.ygeno.2015.05.007.
27. Kawamoto Y., Tsuchihara K., Yoshino T. et al. KRAS mutations in primary tumours and post-FOLFOX metastatic lesions in cases of colorectal cancer. *Br J Cancer* 2012;107(2):340–4. DOI: 10.1038/bjc.2012.218.
28. Kim M.J., Lee H.S., Kim J.H. et al. Different metastatic pattern according to the KRAS mutational status and site-specific discordance of KRAS status in patients with colorectal cancer. *BMC Cancer* 2012;12: 347. DOI: 10.1186/1471-2407-12-347.
29. Kleist B., Kempa M., Novy M. et al. Comparison of neuroendocrine differentiation and KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CA/TP53 mutation status in primary and metastatic colorectal cancer. *Int J Clin Exp Pathol* 2014;7(9):5927–39.
30. Knijn N., Mekenkamp L.J.M., Klomp M. et al. KRAS mutation analysis: a comparison between primary tumours and matched liver metastases in 305 colorectal cancer patients. *Br J Cancer* 2011;104(6):1020–6. DOI: 10.1038/bjc.2011.26.
31. Kopetz S., Overman M.J., Chen K. et al. Mutation and copy number discordance in primary versus metastatic colorectal cancer (mCRC). *J Clin Oncol* 2014;32:5s (suppl; abstr 3509).
32. Lee S., Haq F., Kim D. et al. Comparative genomic analysis of primary and synchronous metastatic colorectal cancers. *PLoS One* 2014;5(9):e90459. DOI: 10.1371/journal.pone.0090459.
33. Li Z.Z., Bai L., Wang F. et al. Comparison of KRAS mutation status between primary tumor and metastasis in Chinese colorectal cancer patients. *Med Oncol* 2016;33(7):71. DOI: 10.1007/s12032-016-0787-z.
34. Losi L., Benhattar J., Costa J. Stability of K-ras mutations throughout the natural history of human colorectal cancer. *Eur J Cancer* 1992;28A(6–7):1115–20.
35. Loupakis F., Pollina L., Stasi I. et al. PTEN expression and KRAS mutations on primary tumors and metastases in the prediction of benefit from cetuximab plus irinotecan for patients with metastatic colorectal cancer. *J Clin Oncol* 2009;27(16):2622–9. DOI: 10.1200/JCO.2008.20.2796.
36. Mariani P., Lae M., Degeorges A. et al. Concordant analysis of KRAS status in primary colon carcinoma and matched metastasis. *Anticancer Res* 2010;30(10):4229–35. DOI: 10.1016/j.prp.2013.02.006.
37. Miglio U., Mezzapelle R., Paganotti A. et al. Mutation analysis of KRAS in primary colorectal cancer and matched metastases by means of highly sensitivity molecular assay. *Pathol Res Pract* 2013;209(4):233–6. DOI: 10.1016/j.prp.2013.02.006.
38. Molinari F., Martin V., Saletti P. et al. Differing deregulation of EGFR and downstream proteins in primary colorectal cancer and related metastatic sites may be clinically relevant. *Br J Cancer* 2009;100(7):1087–94. DOI: 10.1038/sj.bjc.6604848.
39. Mostert B., Jiang Y., Sieuwerts A.M. et al. KRAS and BRAF mutation status in circulating colorectal tumor cells and their correlation with primary and metastatic tumor tissue. *Int J Cancer* 2013;133(1):130–41. DOI: 10.1002/ijc.27987.
40. Murata A., Baba Y., Watanabe M. et al. Methylation levels of LINE-1 in primary lesion and matched metastatic lesions of colorectal cancer. *Br J Cancer* 2013;109(2):408–15. DOI: 10.1038/bjc.2013.289.
41. Oliveira C., Velho S., Moutinho C. et al. KRAS and BRAF oncogenic mutations in MSS colorectal carcinoma progression. *Oncogene* 2007;26(1):158–63.
42. Oudejans J.J., Slebos R.J., Zoetmulder F.A. et al. Differential activation of ras genes by point mutation in human colon cancer with metastases to either lung or liver. *Int J Cancer* 1991;49(6):875–9.
43. Paliogiannis P., Cossu A., Tanda F. et al. KRAS mutational concordance between primary and metastatic colorectal adenocarcinoma. *Oncol Lett* 2014;8(4):1422–6.
44. Park J.H., Han S.W., Oh D.Y. et al. Analysis of KRAS, BRAF, PTEN, IGF1R, EGFR intron 1 CA status in both primary tumors and paired metastases in determining benefit from cetuximab therapy in colon cancer. *Cancer Chemother Pharmacol* 2011;68(4):1045–5. DOI: 10.1007/s00280-011-1586-z.
45. Perrone F., Lampis A., Orsenigo M. et al. PI3KCA/PTEN deregulation contributes to impaired responses to cetuximab in metastatic colorectal cancer patients. *Ann Oncol* 2009;20(1):84–90. DOI: 10.1093/annonc/mdn541.
46. Santini D., Loupakis F., Vincenzi B. et al. High concordance of KRAS status between primary colorectal tumors and related metastatic sites: implications for clinical practice. *Oncologist* 2008;13(12):1270–5. DOI: 10.1634/theoncologist.2008-0181.
47. Schimanski C.C., Linnemann U., Berger M.R. Sensitive detection of K-ras mutations augments diagnosis of colorectal cancer metastases in the liver. *Cancer Res* 1999;59(20):5169–75.
48. Shen Y.Q., Ye Y.B., Zheng X.W. et al. K-ras mutations in colorectal cancer at different stages. *Tumor* 2010;30:134–7.
49. Siyar E.A., Demirci U., Cakmak Oksuzoglu B. et al. KRAS discordance between primary and metastatic tumor in patients with metastatic colorectal carcinoma. *J BUON* 2015;20(1):128–35.
50. Suchy B., Zietz C., Rabes H.M. K-ras point mutations in human colorectal carcinomas: Relation to aneuploidy and metastasis. *Int J Cancer* 1992;52(1):30–3.
51. Thebo J.S., Senagore A.J., Reinhold D.S. et al. Molecular staging of colorectal cancer: K-ras mutation analysis of lymph nodes upstages Dukes B patients. *Dis Colon Rectum* 2000;43(2):155–9; discussion 159–62.
52. Tie J., Lipton L., Desai J. et al. KRAS mutation is associated with lung metastasis in patients with curatively resected colorectal cancer. *Clin Cancer Res* 2011;17(5):1122–30. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-10-1720.
53. Vakiani E., Janakiraman M., Shen R. et al. Comparative genomic analysis of primary versus metastatic colorectal carcinomas. *J Clin Oncol* 2012;30(24):2956–62. DOI: 10.1200/JCO.2011.38.2994.
54. Vignot S., Lefebvre C., Frampton G.M. et al. Comparative analysis of primary tumour and matched metastases in colorectal cancer patients: evaluation

- of concordance between genomic and transcriptional profiles. *Eur J Cancer* 2015;51(7):791–9.
DOI: 10.1016/j.ejca.2015.02.012.
55. Voutsina A., Tzardi M., Kalikaki A. et al. Combined analysis of KRAS and PIK3CA mutations, MET and PTEN expression in primary tumors and corresponding metastases in colorectal cancer. *Mod Pathol* 2013;26(2):302–13.
DOI: 10.1038/modpathol.2012.150.
56. Watanabe T., Kobunai T., Yamamoto Y. et al. Heterogeneity of KRAS status may explain the subset of discordant KRAS status between primary and metastatic colorectal cancer. *Dis Colon Rectum* 2011;54(9):1170–78.
DOI: 10.1097/DCR.0b013e31821d37a3.
57. Weber J.C., Meyer N., Pencreach E. et al. Allelotyping analyses of synchronous primary and metastasis CIN colon cancers identified different subtypes. *Int J Cancer* 2007;120(3):524–32.
58. Xian H.B., Yu H.B., Zhang J.R. Comparison of the grade of concordance in terms of K-ras status between primaries and related liver metastases in colorectal cancer. *Chin J Cancer Prev Treat* 2010;12:926–9.
59. Zauber P., Sabbath-Solitare M., Marotta S.P., Bishop D.T. Molecular changes in the Ki-ras and APC genes in primary colorectal carcinoma and synchronous metastases compared with the findings in accompanying adenomas. *Mol Pathol* 2003;56(3):137–40.
60. Vermaat J.S., Nijman I.J., Koudijs M.J. et al. Primary colorectal cancers and their subsequent hepatic metastases are genetically different: implications for selection of patients for targeted treatment. *Clin Cancer Res* 2012;18(3):688–99.
DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-11-1965.
61. Schafroth C., Galván J.A., Centeno I. et al. VE1 immunohistochemistry predicts BRAF V600E mutation status and clinical outcome in colorectal cancer. *Oncotarget* 2015;6(39):41453–63.
DOI: 10.18632/oncotarget.6162.
62. Tougeron D., Cortes U., Ferru A. et al. Epidermal growth factor receptor(EGFR) and KRAS mutations during chemotherapy plus anti-EGFR monoclonal antibody treatment in metastatic colorectal cancer. *Cancer Chemother Pharmacol* 2013;72(2):397–403.
DOI: 10.1007/s00280-013-2211-0.
63. Gonzalez de Castro D., Angulo B., Gomez B. et al. A comparison of three methods for detecting KRAS mutations in formalin-fixed colorectal cancer specimens. *Br J Cancer* 2012;107(2):345–51.
DOI: 10.1038/bjc.2012.259.
64. Tougeron D., Lecomte T., Pagès J.C. et al. Effect of low-frequency KRAS mutations on the response to anti-EGFR therapy in metastatic colorectal cancer. *Ann Oncol* 2013;24(5):1267–73.
DOI: 10.1093/annonc/mds620.
65. Baas J.M., Krens L.L., Guchelaar H.J. et al. Concordance of predictive markers for EGFR inhibitors in primary tumors and metastases in colorectal cancer: a review. *Oncologist* 2011;16(9):1239–49.
DOI: 10.1634/theoncologist.2011-0024.
66. Han C.B., Li F., Ma J.T., Zou H.W. Concordant KRAS mutations in primary and metastatic colorectal cancer tissue specimens: a meta-analysis and systematic review. *Cancer Invest* 2012;30(10):741–7.
DOI: 10.3109/07357907.2012.732159.
67. Mao C., Wu X.Y., Yang Z.Y. et al. Concordant analysis of KRAS, BRAF, PIK3CA mutations, and PTEN expression between primary colorectal cancer and matched metastases. *Sci Rep* 2015;5:8065.
DOI: 10.1038/srep08065.
68. Graham D.M., Arseneault M., Sukhai M.A. et al. Analysis of clonal evolution in colorectal cancer. *J Clin Oncol* 2014;32:5s(suppl; abstr 3510).
69. Fabbri F., Carloni S., Zoli W. et al. Detection and recovery of circulating colon cancer cells using a dielectrophoresis-based device: KRAS mutation status in pure CTCs. *Cancer Lett* 2013;335(1):225–31.
DOI: 10.1016/j.canlet.2013.02.015.
70. Tortola S., Steinert R., Hantschick M. et al. Discordance between K-ras mutations in bone marrow micrometastases and the primary tumor in colorectal cancer. *J Clin Oncol* 2001;19(11):2837–43.